

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ**

**Регистрационный номер:** P N001084/01

**Торговое наименование:** Сульфацил-натрия

**Международное непатентованное название:** сульфацетамид

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав**

1 мл раствора содержит:

Действующее вещество:

сульфацетамид натрия (сульфацил-натрия) - 200 мг

Вспомогательные вещества:

натрия тиосульфат - 1,0 мг, хлористоводородная кислота (соляная кислота) - до pH 7,5 - 8,7,  
вода очищенная - до 1 мл

**Описание:** прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство, сульфаниламид.

**Код АТХ: S01AB04**

**Фармакологическое действие**

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с пара-аминобензойной кислотой, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Фармакокинетика**

Проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

**Показания**

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболеваний глаз у взрослых.

**Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы**

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 5-6 раз в сутки. Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают по 1 капле раствора в каждый глаз трехкратно с интервалом 10 минут.

#### **Побочное действие**

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Совместное применение с прокаином и тетракаином снижает бактериостатический эффект.

Несовместим с солями серебра.

#### **Особые указания.**

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

#### **Форма выпуска**

Капли глазные 20 %.

1,5 мл или 5 мл в тубик-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления.

1, 2, 4, 5 или 10 тубик-капельниц с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению тубик-капельницы.

5 мл или 10 мл во флакон-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления.

1 или 2 флакон-капельницы с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению флакон-капельницы.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С для препарата в тубик-капельницах.

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С для препарата во флакон-капельницах.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### **Срок годности**

3 года.

Срок годности препарата после вскрытия – 7 суток (для препарата в тубик-капельницах);

Срок годности препарата после вскрытия – 1 месяц (для препарата во флакон-капельницах).

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»,  
109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, 25. Тел./ факс (495) 678-00-50/911-42-10.

<http://www.endopharm.ru>.

**Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»,  
109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 1, стр. 2.